

Version: 08.

Granskat av Läkemedelsverket:
17 mars 2023

Pfizer

Solnavägen 3H, 113 63 Stockholm
Tel 08-550 520 00



Fortsättning från andra sidan.

- upptäcker eventuell ny tillväxt på huden eller förändringar i befintliga födelsemärken eller fläckar.
- får symtom på interstitiell lungsjukdom, såsom andfåddhet.
- får tecken och symtom i buken, såsom magsmärta, buksmärta, blod i avföringen eller någon förändring i dina avföringsvanor tillsammans med feber.
- får gul hud, illamående eller kräkningar.
- blir gravid eller planerar att bli gravid.

[pfizer.se](https://www.pfizer.se)

Du ska inte få levande vaccin medan du tar XELJANZ.

XELJANZ får inte användas under graviditet.

Fertila kvinnor ska rekommenderas att använda effektiva preventivmedel under behandling med XELJANZ och i minst fyra veckor efter den sista dosen.

Kvinnor ska inte amma medan de behandlas med XELJANZ.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar i samband med XELJANZ-behandlingen ska du tala med läkare eller apotekspersonal, eller rapportera dessa omgående till:

Läkemedelsverket
Box 26

751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Patientens namn:

Läkarens namn:

Läkarens telefonnummer:

Datumet då du började ta Xeljanz:



XELJANZ[®] (tofacitinib)

PATIENTKORT

Version: 08.

Granskat av Läkemedelsverket: 17 mars 2023

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation om XELJANZ.

Patientkortet är avsett att användas tillsammans med bipacksedeln som är tillgänglig i läkemedelsförpackningen samt elektroniskt via "Läkemedelsfakta" på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se.

Be läkaren/apotekspersonalen förklara sådant i denna information som du inte förstår. Ha alltid detta kort med dig och visa upp det för alla läkare och all apotekspersonal som på något sätt medverkar i din vård.

Om du slutar att ta XELJANZ ska du ha med dig detta kort i minst 2 månader efter att du tagit den sista dosen av XELJANZ.

Mer information finns i bipacksedeln för XELJANZ. Använd XELJANZ på det sätt som beskrivs i bipacksedeln.

Informera läkaren eller apotekspersonalen om ALLA läkemedel du tar, både receptbelagda och receptfria, och även vitaminer och naturläkemedel.

Att ta XELJANZ tillsammans med vissa läkemedel kan öka risken för biverkningar, nedsatt immunförsvar och infektion.

Vissa läkemedel avlägsnas ur kroppen via samma vägar som XELJANZ. Om de tas tillsammans med XELJANZ kan de förändra mängden XELJANZ i kroppen och dosen XELJANZ kan behöva ändras.

Du ska tala om för din läkare om du använder läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

- Antibiotika, exempelvis rifampicin, som används för att behandla bakteriella infektioner
- flukonazol och ketokonazol som används för att behandla svampinfektioner

Behandlingen med XELJANZ kan öka risken för infektioner och maligniteter (inklusive lungcancer, lymfom och icke-melanom hudcancer).

Patienter som är 65 år eller äldre kan ha en ökad risk för att få infektioner, hjärtattack och vissa typer av cancer. Din läkare kan besluta att XELJANZ inte är lämpligt för dig.

Tala **omedelbart** om för din läkare om du:

- får plötslig andnöd eller andningssvårigheter, bröstsmärta eller smärta i övre delen av ryggen, svullnad i ett ben eller en arm, smärta eller ömhet i ett ben eller rodnad eller missfärgning i ett ben eller en arm när du tar XELJANZ, eftersom detta kan vara tecken på en propp i lungorna eller venerna.
- får symtom på en infektion, såsom feber, ihållande hosta, viktminskning eller överdriven trötthet.
- får symtom på herpes zoster, såsom smärtsamma hudutslag eller blåsor.

- har varit i nära kontakt med en person som har tuberkulos.
- får kraftig bröstsmärta eller tryck över bröstet (som kan sprida sig till armar, käke, hals och rygg), andnöd, kallsvett, yrsel eller plötslig yrsel, eftersom dessa kan vara tecken på en hjärtattack.
- får svullnad i lymfkörtlar i hals, armhålor eller ljumskar, ständig trötthet, feber; nattsvettningar, ihållande eller förvärrad hosta, svårt att andas, heshet eller väsande andning eller oförklarlig viktminskning.

Fortsättning följer på andra sidan.